


# Fungizide in Winterweizen in 2013, Versuchsstandort Friedberg-Niederweisel

Standardbeizung Rubin TT	31/32 03.05.2013	37/39 18.05.2013	61/69 16.06.2013	GD 5%: 5,019 dt, SNK: alle Variante A
	Kontrolle	-	-	100
	Capalo 1,2	Aviator Xpro Duo 0,75 + 0,75	-	111
	-	Aviator Xpro Duo 0,75 + 0,75	-	111
+ Systiva-Beizung	-	-	-	108
+ Systiva-Beizung	Capalo 1,2	Aviator Xpro Duo 0,75 + 0,75	-	111
+ Systiva-Beizung	-	Aviator Xpro Duo 0,75 + 0,75	-	111
	Capalo 1,2	Aviator Xpro Duo 0,75 + 0,75	Prosaro 1,0	110
	Capalo 1,2	Aviator Xpro Duo 0,75 + 0,75	Prosaro 1,0 + AHL 30 I	111
	Prüfmittel Carboxamid	Prüfmittel Carboxamid	Prüfmittel Carboxamid	110
	Capalo 1,2 + Lebosol Triple 1,0	Aviator Xpro Duo 0,75 + 0,75 + Lebosol Triple 1,0	Prosaro 1,0 + Lebosol Triple 1,0	110
	Prüfmittel MAC 92700F 1,5	Epoxion Top 2,5	Taspa + Osiris 0,5 + 0,3	111
	Capalo 1,2	Adexar 2,0	Skyway Xpro 1,25	111
	Dithane Neo Tec 2,0	Bravo 500 2,0	Bravo 500 2,0	110
		Adexar 2,0		111
		Prüfmittel Ceriax 2,5		109
		Champion + Diamant 0,9 + 0,9		106
		Seguris + Amistar Opti 1,0 + 1,5		109
		Osiris 3,0		107

Aussaat 09.10.2012, Sorte JB Asano, 160 kg/ha N gesamt, 29.10.12 Ciral + Sumimax 0,025 + 0,05, 16.04.13 1,0 CCC, 16.05.13 CCC + Moddus 0,5 + 0,25

Kontrolle relativ 100 = 70,65 dt/ha

# Fungizide in Wintergerste in 2013, Versuchsstandort Friedberg-Niederweisel



## Zusammenfassung:

Die mit Systiva und Rubin TT gebeizte Variante ohne weitere Fungizidanwendungen konnte 8 % Mehrertrag gegenüber der Rubin TT gebeizten Variante erzielen. Zusätzliche Fungizidanwendungen nach Systiva erbrachten nur einen minimalen Ertragsgewinn, während der Fungizideinsatz nach Rubin TT zu 11 % Mehrertrag führte. So muss die Fungizidstrategie im Frühjahr nach vorausgegangener Systivabeizung neu angepasst werden.

Doppel- und Dreifachanwendungen waren ertraglich gleich. Die Einfachbehandlungen fielen nur ca. 2,5 % schlechter aus. Auffällig war, dass auch eine Variante mit ausschließlich 3 vorbeugend wirkenden Kontaktmitteln ertraglich auf gleichem Niveau wie die Carboxamid-oder Strobilurin-Varianten .