


Herbizide in Wintergerste gegen Ackerfuchsschwanz im Herbst 2013, LLH-Versuchsstandort Bebra

Varianten	HRAC	WG BBCH 09-10 AWM am 30.10.2013	WG BBCH 12-13 AWM am 18.11.2013
Herold SC + Lentipur 700	K3+F1+C2	0,6 + 1,5	
Herold SC + Activus SC	K3+F+K1	0,6 + 2,0	
Herold SC + Boxer	K3+F+N	0,6 + 2,5	
Malibu + Lentipur 700	K3+K1+C2	4,0 + 1,5	
Cadou Forte	K3+F	1,0	
BAS 75800 H*	K3+F1	1,0	
Cadou Forte + Axial 50	K3+F+A		1,0 + 0,9
Lentipur 700 + Axial 50	C2+A		3,0 + 0,9
Herold SC; Axial 50	K3+F1; A	0,6	0,9
Fenikan	C2+F1	3,0	
Activus SC + Axial 50			2,5 + 0,9



* = Prüfmittel, noch nicht zugelassen Aussaat 25.09.2013

Bonitur Ackerfuchsschwanz am 20.06.14, 258 Ackerfuchsschwanzähren/m²

■ Wirkungsgrad gegen Ackerfuchsschwanz in %