




Fungizidvergleich in Wintergerste in 2017/2018

Sorte KWS Higgins; LLH-Versuchsstandort Korbach



* = Prüfmittel, noch nicht zugelassen


** = Mittel für den biologischen Anbau

■ Ertrag rel.



Fungizidvergleich in Wintergerste in 2017/2018

LLH-Versuchsstandort Korbach



* = Prüfmittel, noch nicht zugelassen


** = Mittel für den biologischen Anbau

■ Ramularia ■ Helminthosporium
■ Rhynchosporium



Fungizidvergleich in Wintergerste in 2017/2018

LLH-Versuchsstandort Korbach



* = Prüfmittel, noch nicht zugelassen

** = Mittel für den biologischen Anbau

■ grüne Blattfläche



Fungizidvergleich in Wintergerste in 2017/2018

LLH-Versuchsstandort Korbach

HESSEN



Sorte KWS Higgins, Aussaat 30.09.2017, pfluglos

Nmin 0-90 cm 30, P205 8, K20= 24, Mg0 19, pH 6,5, AZ 55

N-Düngung:

21.03.2018, BBCH 25: 60 N als ASS

17.04.2018, BBCH 27: 30 N als KAS

09.05.2018, BBCH 49: 50 N als KAS

Herbizide:

12.10.2017, BBCH 11: Bacara Forte + Cadou SC 0,75 + 0,3

Wachstumsregler

20.04.2018, BBCH 32-34: Moddus 0,6

07.05.2018, BBCH 49 Camposan Extra 0,2