




Fungizidvergleich II in Winterweizen in 2017/2018

Sorte Bergamo; LLH-Versuchsstandort Marburg



Kontrolle: 93,60 dt/ha, rel. 100
GD 5% = 2,222






Fungizidvergleich II in Winterweizen in 2017/2018

LLH-Versuchsstandort Marburg



Angaben in % der Blattfläche,
Bonitur 21.06.2018






Fungizidvergleich II in Winterweizen in 2017/2018

LLH-Versuchsstandort Marburg



Angaben in % der Blattfläche,
Bonitur 06.07.2018



* In Kontrolle Microdochium nicht bonitierbar, da grüne Blattfläche zu gering.

0 20 40 60
■ grüne Blattfläche ■ Microdochium ■ Braunrost



Fungizidvergleich II in Winterweizen in 2017/2018

LLH-Versuchsstandort Marburg

HESSEN



Sorte Bergamo, Aussaat 18.10.2017,

Nmin 2018: 18 kg/ha N bei 0-90 cm,

N-Düngung:

06.03.2018: 80 N als AHL

18.04.2018: 40 N als AHL

29.05.2018: 60 N als AHL

Herbizide:

Cadou Forte Set 0,75 + 0,3

Wachstumsregler

09.04.2018: CCC 720 1,0

18.04.2018: Moddus + CCC 720 0,3 + 0,5