

Ungrasbekämpfung in Leguminosen

| Präparat (zugelassen bis) | Aufwandmenge l/kg/ha | | | | Bemerkungen |
|--|----------------------|------------------|-----------|-------------------|---|
| | Futter- erbsen | Acker- bohnen | Lupinen | Soja- bohne*** | |
| 1. Präparate gegen Windhalm, Ackerfuchsschwanz, Einj. Rispel (Voraufbau) | | | | | |
| Stomp Aqua** (06/2021) | 4,0 - 4,4 | 4,0 - 4,4 | 2,6 | 1,5 | bis 5 Tage nach d. Saat |
| Bandur (12/2024) | 4,0 | 4,0 | – | – | bis 3 Tage n. d. Saat, feines Saatbett, Bodenfeuchte, auch gegen Hirse |
| Boxer** (04/2021) | 4,0 - 5,0 | 4,0 - 5,0 | 4,0 | – | Anwendung bis 5 Tage n. d. Saat, Saattiefe 5 cm Erbsen, 8 cm Ackerbohnen |
| Spectrum Plus** (12/2027) | 3,0 - 4,0 | 3,0 - 4,0 | 3,0 - 4,0 | 3,0 - 4,0 | VA bis kurz vor dem Durchstoßen d. Kbl., in Erbsen auch im NA, Wirkung v.a. gegen Hirsen u. Rispel; Teilwirkung gegen Afu, gegen Windhalm und Flughafer nicht ausreichend |
| 2. Präparate gegen Ausfallgetreide, Ungräser (Afu, Windh.), Flughafer, Hirsen (Nachauflauf) | | | | | |
| Fusilade Max (12/2022) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | gegen Ausfallgetreide, Ungräser einschl. Hirsen u. Flughafer, ab 2-Blattstadium d. Gräser |
| Agil-S (11/2022) | 0,75 | 0,75 | – | – | |
| Panarex (11/2022) | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,0 | – | – | |
| Gallant Super**** (12/2020) | 0,4 - 0,5 | 0,4 - 0,5 | – | – | |
| Focus Aktiv Pack (12/2025) | 1,5+1,5 | 1,5 + 1,5 | – | 1,5 + 1,5 | |
| Select 240 EC + Radiamix* (12/2024) | 0,5 + 1,0 | 0,5 + 1,0 | 0,5 + 1,0 | – | gegen Ungräser einschl. Hirsen u. Flughafer und Einjähriger Rispel |
| 3. Präparate gegen Quecken (Nachauflauf) | | | | | |
| Fusilade Max | 2,0 | – | 2,0 | 2,0 | bei 15 - 20 cm Wuchshöhe der Quecke |
| Panarex | 2,25 | 2,25 | – | – | |
| Focus Aktiv Pack | 2,5+2,5 | 2,5 + 2,5 | – | 2,5 + 2,5 | |
| Select 240 EC+Radiamix* | – | 1,0 + 1,0 | – | – | |

- = keine Zulassung in der Kultur

* in Futtererbsen und Ackerbohnen nur in Beständen zur Saatguterzeugung!

** Abdriftauflagen für Pendimethalin- und Prosulfocarbhaltige Präparate beachten!

*** Gräserherbizide im Nachauflauf in Sojabohnen nur bei ausreichender Wachsschicht und nicht bei Witterungsstress einsetzen.

****Zulassungswiderruf zum 31.12.2020, Aufbrauchfrist: 30.06.2022.