

Herbizideinsatz in Leguminosen (Ungrasbekämpfung)

Präparat (zugelassen bis)	Aufwandmenge l/kg/ha				Bemerkungen
	Futtererbsen	Ackerbohnen	Lupinen	Sojabohne***	
1. Präparate gegen Windhalm, Ackerfuchsschwanz, Einj. Risse (Vorauflauf)					
Stomp Aqua** (06/2022)	4,0 - 4,4	4,0 - 4,4	2,6	1,5	bis 5 Tage nach d. Saat
Bandur (12/2024)	4,0	4,0	–	–	bis 3 Tage n. d. Saat, feines Saatbett, Bodenfeuchte, auch gegen Hirse
Boxer** (04/2022)	4,0 - 5,0	4,0 - 5,0	4,0	–	Anwendung bis 5 Tage n. d. Saat, Saattiefe 5 cm Erbsen, 8 cm Ackerbohnen
Spectrum Plus** (12/2027)	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	VA bis kurz vor dem Durchstoßen d. Kbl., in Erbsen auch im NA, Wirkung v.a. gegen Hirsen u. Risse; Teilwirkung gegen Afu, gegen Windhalm und Flughafer nicht ausreichend
2. Präparate gegen Ausfallgetreide, Ungräser (Afu, Windh.), Flughafer, Hirsen (Nachauflauf)					
Fusilade Max (12/2022)	1,0	1,0	1,0	1,0	gegen Ausfallgetreide, Ungräser einschl. Hirsen u. Flughafer, ab 2-Blattstadium der Gräser
Agil-S (11/2022)	0,75	0,75	–	–	
Panarex (11/2022)	0,8-1,0	0,8 - 1,0	–	–	
Targa Max (11/2022)	0,4-0,6	0,4-0,6	–	–	
Gallant Super¹ (12/2022)	0,4 - 0,5	0,4 - 0,5	–	–	
Focus Aktiv Pack (12/2025)	1,5+1,5	1,5 + 1,5	–	1,5 + 1,5	gegen Ungräser einschl. Hirsen u. Flughafer und Einjähriger Risse
Select 240 EC + Radiamix* (12/2024)	0,5 + 1,0	0,5 + 1,0	0,5 + 1,0	–	
3. Präparate gegen Quecken (Nachauflauf)					
Fusilade Max	2,0	–	2,0	2,0	bei 15 - 20 cm Wuchshöhe der Quecke
Panarex	2,25	2,25	–	–	
Targa Max (11/2022)	1,0-1,25	1,0-1,25	–	–	
Focus Aktiv Pack	2,5+2,5	2,5 + 2,5	–	2,5 + 2,5	
Select 240 EC+Radiamix*	–	1,0 + 1,0	–	–	

- = keine Zulassung in der Kultur

¹ = Zulassung widerrufen, Aufbrauchfrist bis 30.06.2022

* in Futtererbsen und Ackerbohnen nur in Beständen zur Saatguterzeugung!

** Abdriftauflagen für Pendimethalin- und Prosulfocarb-haltige Präparate beachten!

*** Gräserherbizide im Nachauflauf in Sojabohnen nur bei ausreichender Wachsschicht und nicht bei Witterungsstress einsetzen

