

Mais-Herbizidstrategie bei Untersaaten: Untersaat mit **deutschem Weidelgras**

Wenn der Maisbestand eine Höhe von 30-40 cm erreicht hat, wird das Weidelgras ausgesät. Die Ausbringung kann mit einem pneumatischen Düngerstreuer (15-20 kg/ha) oder mit dem Güllefass (10 - 15 kg/ha) erfolgen. Zwischen der Herbizidbehandlung und der Aussaat sollten mindestens zwei Wochen liegen. Kommen Bodenherbizide zur Anwendung, beträgt der Abstand mindestens sechs Wochen. Die Aufwandmengen der Herbizide sind auf maximal 50% der zugelassenen Aufwandmenge zu begrenzen.

Vorlage	Nachlage	Winden- knöterich	Gänsefuß	Kamille	Kletten- labkraut	Schw. Nacht- schatten	Storch- schnabel	Ackerfuchs- schwanz	Hühner- hirse	Borsten- hirse	Fingerhirse
Vorauslauf bis BBCH 11	Nachauflauf BBCH 12-13										
3,0 l/ha Stomp Aqua/Activus	0,35 l/ha Motivell f. + 0,2 kg/ha Arrat + 1,0 l/ha Dash	XX	XXX	XXX	XX	XX	(X)	X	X	X	(X)
	1,0 l/ha Callisto + 0,015 kg/ha Peak	XXX	XXX	XXX	XX	XXX	(X)	O	XX	(x)	X
	1,5 l/ha Laudis	X(X)	XXX	XX	XX	XXX	(X)	O	XX	X	X
1,0 l/ha Calaris	1,0 l/ha Elumis + 0,015 kg/ha Peak	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	X	XX	XXX	XXX	XX
	1,7 l/ha Laudis	X(X)	XXX	XXX	X(X)	XXX	X	(X)	XXX	XX	XX

- o = keine Wirkung, bzw. bei Gräserherbiziden zu spätem Anwendungstermin zur Bekämpfung zweikeimblättriger Unkräuter nicht empfohlen
x = Wirkung nicht ausreichend, Tankmischpartner erforderlich
xx = Wirkung nur unter günstigen Bedingungen und bei niedrigem Besatz ausreichend
xxx = gute Wirkung



Mais-Herbizidstrategie bei Untersaaten: Untersaat mit **Rotschwengel**

Der Rotschwengel wird in einer Saatstärke von 4 kg/ha bei der Maisaussaat ausgebracht. Die Unkrautbekämpfung erfolgt nach dem Auflaufen der Untersaat. Folgende Mischungen können hier zur Anwendung kommen:

Nachauflauf	Winden- knöterich	Gänsefuß	Kamille	Kletten- labkraut	Schw. Nacht- schatten	Storch- schnabel	Ackerfuchs- schwanz	Hühner- hirse	Borsten- hirse	Fingerhirse
BBCH 12-14										
2,5 l/ha Stomp Aqua/Activus SC + 1,0 l/ha Sulcogan + 0,2 kg/ha Arrat + 1,0 Dash	XX	XXX	XXX	XXX	XXX	(X)	O	(X)	O	O
2,5 l/ha Stomp Aqua/Activus SC + 1,0 l/ha Callisto + 0,015 kg/ha Peak	XXX	XXX	XXX	XX	XXX	(X)	O	XX	(X)	X
2,5 l/ha Stomp Aqua/Activus SC + 0,2 kg/ha Arrat + 1,0 Dash	XXX	XXX	XXX	XXX	XX	(X)	O	O	O	O
1,0 l/ha Laudis + 1,0 l/ha Sulcogan	XX	XXX	XXX	XX	XXX	(X)	(X)	XX	X	X
BBCH 16-18										
0,2 kg/ha Arrat + 1,0 l/ha Dash	XX	XX	XX	XX	X	X	O	O	O	O

Legende:

- o = keine Wirkung, bzw. bei Gräserherbiziden zu spätem Anwendungstermin zur Bekämpfung zweikeimblättriger Unkräuter nicht empfohlen
- x = Wirkung nicht ausreichend, Tankmischpartner erforderlich
- xx = Wirkung nur unter günstigen Bedingungen und bei niedrigem Besatz ausreichend
- xxx = gute Wirkung

