

Wirkungsspektren von Maisherbiziden (Teil 1)

Herbizidpack/ Kombination Solopräparate	Komponenten	Aufwandmenge in l/ha oder kg/ha	bei Hangneigung >2 % Abstand zu Oberflächenge- wässern in m	Gewässerabstand bei 90 % in m	Saumabstand bei 90 % in m	Amrant	Bingelkraut	Franzosenkraut	Kamille	Klettenlabkraut	Flohknoterich	Vogelknoterich	Windenknoterich	Melde/Gänsefuß	Nachtschatten	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Ackerfuchsschw.	Borstenhirse	Fadenhirse	Hühnerhirse	Quecke	regentest in Stunden	Bemerkungen			
Hirseproblemstandorte mit Hühnerhirse, Finger-/Fadenhirse und Borstenhirse, Mischverunkrautung mit Nachtschatten																											
Laudis-Aspect Pack	Laudis	2	10	4	0	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xx	x	xx	xxx	xxx	o	2	Gräserbekämpfung ohne Sulfonylharnstoff Vorausfl. bis 3-Blatt, gute Ergebn. bei BBCH 12,				
	+ Aspect*	1,5				xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx	x	xx	xxx	xx	xx	x	xx	xxx	xxx							
	Adengo	0,33	20	4	0	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx	x	xx	xxx	xx	xx	x	xx	xxx	xxx							
Elumis Gold Pack	Elumis**	1,25	20	4	5	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	2			
	Gardo Gold*	2,5				xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xx	xxx	xx			
Zintan Platin Pack + Peak	Dual Gold	1	10	4	0	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	o	x	xx	xxx	o	2				
	+ Calaris*	1,25				xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	o	x	xx		xxx	o	
	+ Peak	0,02				xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	o	x	xx		xxx	o	
Successor Top 3.0	Successor T*	3	20	4	0	xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	o	x	x	xxx	o	2	ohne blattaktiven Gräserpartner. GGF zumischen			
	+ Border	0,75				xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	o	x	x	xxx		o		
	Diniro	0,4				xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	x	xxx		xxx	2	
	+ Adigor	1,2	20	4	0	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	x	xxx	xxx	2				
	+ Successor T*	3	20	4	0	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	o	x	xx	xx	0	2	ohne blattaktiven Gräserpartner. GGF zumischen			
	Spectrum Gold*	2	20	4	0	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	o	x	xx	xx	0	2				
	+ Callisto	0,8				xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xx	o	x	xx	xx	0				
	Arigo	0,25				xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx	x(x)	xxx	xx		3		
	+ Trend	0,25	20	4	5	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx	x(x)	xxx	xx	3				
	+ Successor T*	2,5	20	4	5	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx	x(x)	xxx	xx	3				
	Zingis	0,25	20	4	0	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xx	x	xx	xxx	xxx	o	2				
	+ Mero	1,75				xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xx	x	xx	xxx	xxx	o					
	Spectrum Gold*	2				xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xx	x	xx	xxx	xxx	o					
	Zingis	0,25	20	4	0	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xx	x	xx	xxx	xxx	o	2				
+ Mero	1,75	xxx				xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xx	x	xx	xxx	xxx	o						
Successor T*	2	xxx				xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xx	x	xx	xxx	xxx	o						
Hirsestandorte, Mischverunkrautung und Gräser (Flughafer, Fuchsschwanz). Bodenwirkung gegen Hirsen.																											
MaisTer Power Aspect	MaisTer power	1,25	20	4	5	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	2	Bei starkem Gräserbesatz: 1,5 + 1,5			
	+ Aspect*	1,25				xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	
Elumis P Dual Pack	Dual Gold	1,25	20	4	5	xxx	xx	xxx	xx	xx	xx	xx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	2	hervorzuheben die Wirkung auf Ampfer und Knöteriche, TBA frei!			
	+ Elumis	1,25				xxx	xx	xxx	xx	xx	xx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx				
	+ Peak	0,02				xxx	xx	xxx	xx	xx	xx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx				
Arrat+Dash +Elumis	Arrat + Dash	0,2 + 1,0	20	4	0	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	2	TBA frei!		
	+ Elumis	1				xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xx				
Principal S Pack	Principal**	0,075	20	4	5	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	x	xx	xx	x	xxx	xx	xx	x	xxx	xx	4	Bei Nachtschatten: + Kampeki 0,3-0,4 l/ha oder+ Sulcogan 0,5 l/ha				
	+ Trend	+ 0,25				xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	x	xx	xx	x	xxx	xx	xx	x	xxx	xx						
	+ Successor T	2,5				xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	x	xx	xx	x	xxx	xx	xx	x	xxx	xx						
Solo	Adengo	0,25 -0,33	20	4	0	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx	xx	xxx	xxx	xx	xx	x	xx	xxx	xxx	x	-	Einsatz VA-BBCH 12 TBA frei				



Wirkungsspektren von Maisherbiziden (Teil 2)

Herbizidpack	Komponenten	Aufwandmenge in l/ha oder kg/ha	bei Hangneigung >2 % Abstand zu Oberflächengewässern in m	Gewässerabstand bei 90 % in m	Saumabstand bei 90 % in m	Amrant	Bingelkraut	Franzosenkraut	Kamille	Klettenlabkraut	Flohknöterich	Vogelknöterich	Windknöterich	Melde/Gänsefuß	Nachtschatten	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Ackerfuchsschw.	Borstenhirse	Fadenhirse	Hühnerhirse	Quecke	regentest in Stunden	Bemerkungen	
Mischverunkrautung und Gräser (Quecke, Flughafer, Fuchsschwanz). Keine Bodenwirkung gegen Hirsen.																									
Elumis Gold Pack	Elumis**	1,25	20	4	0	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xx	xxx	xx	2		
	+Gardo Gold*	1,25																							
	Callisto	1	20	5	0	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	xxx	xx	x	xxx	xx	2		
	+ Motivell forte**	0,6																							
	+ Successor T*	2,5																							
Mischverunkrautung																									
	Onyx	0,75	5	4	5	xxx	xx	xxx	x	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	x	x	o	x	x	xx	o	1	2 Beh. im Splitting von je 0,75 + 0,75 TBA frei!	
	+ Callisto	0,75																							
	Calaris*	1,25	10	4	0	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	x	o	o	x	xx	xx	o	1	ohne Sulfonylharnstoff	
	+ Laudis	1,5																							
Solo	Calaris*	1,25	10	4	0	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	x	o	o	x	xx	o	1	Vorteile bei Nachtschatten		

* NG 362: Der Anwender muss prüfen, ob in den Jahren 2020-2021 bereits ein Mittel mit dem Wirkstoff Terbutylazin angewendet wurde. Falls dies der Fall ist, ist die Anwendung mit einem Terbutylazin-haltigen Produkt auf der selben Fläche in 2022 unzulässig.

** Nicosulfuronhaltig, im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung mit dem Wirkstoff Nicosulfuron auf der selben Fläche

o = keine Wirkung, bzw. bei Gräserherbiziden zu spätem Anwendungstermin zur Bekämpfung zweikeimblättriger Unkräuter nicht empfohlen

x = Wirkung nicht ausreichend, Tankmischpartner erforderlich

xx = Wirkung nur unter günstigen Bedingungen und bei niedrigem Besatz ausreichend

xxx = gute Wirkung

