Insektizide zur Maiszünslerbekämpfung

Präparat (zugelassen bis)	**Wirkstoffgehalt (g/l/kg)**	**WK***	**Aufwand-menge (l/g/kg)**	**Einsatztermin**	**Indikation**	**Warte-zeit**	**max. Anzahl Behand-lungen**
Coragen; Voliam (31.05.2028)	Chlorantraniliprol (Rynaxypyr) 200	28	0,125 0,125	ab Eiablage	Mais Zuckermais	35 14	2 2
DecisForte/ Nuyard**** (15.08.2027)	Deltamethrin 100	3A	0,075	zum Larvenschlupf	Mais	F***	1
SpinTor/ Nexsuba (15.03.2026)	Spinosad 480	5	0,2	zum Larvenschlupf	Mais	F***	1
Mospilan SG; Danjiri (28.02.2026)	Acetamiprid 200	4A	0,325	zum Larvenschlupf	Zuckermais	F***	2
Mimic (31.01.2028)	Tebufenocid 240	18	0,75	zum Larvenschlupf	Mais	42	1

*= Wirkstoffklasse nach: Insecticide Resistance Action Committee (IRAC).
**= NG405: Kein Einsatz auf drainierten Flächen; NW 607: 90 % abdriftmindernde Technik erforderlich, 15m Abstand.
***= F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.